doitdifferent!

TABERNIL DOXICICLINA

Antibiótico en Solución Oral

COMPOSICIÓN:
Doxiciclina (hiclato) 100 mg
Excipientes: c.s.p. 1ml.

INDICACIONES:
Tratamiento de procesos infecciosos, respiratorios o digestivos, causados por microorganismos sensibles.
Tratamiento de clamidiasis en psitácidas.
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

ESPECIES DE DESTINO: Aves (pájaros de jaula: canarios, jilgueros, periquitos, etc.).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
Vía oral, en el agua de bebida a razón de 50 mg de doxiciclina/kg p.v., durante 5 días consecutivos.

Debe en cada caso establecerse el consumo medio de agua de los animales a tratar; a modo de orientación puede tomarse como consumo estándar 15 ml de agua por cada 100 g de p.v./día, en cuyo caso la dosis a administrar corresponderá a 7 gotas de **TABERNIL DOXICICLINA** por cada 100 ml de agua/día. Diariamente debe prepararse el agua medicada.

Para el tratamiento de la clamidiasis en psitacidas, se administrará directamente a los animales durante 45 días seguidos, dos veces al día, la dosis de 50 mg de doxiciclina/kg p.v. (equivalente a 0,5 ml de **TABERNIL DOXICICLINA**/kg p.v.). Esta dosis corresponde a 1 gota de **TABERNIL DOXICICLINA** por cada 100 g de p.v. de los animales, administrada dos veces al día. Para una correcta dosificación es preciso pesar individualmente a los animales para establecer la dosis, tomado como base que cada gota aporta 5 mg de doxiciclina. Evite su administración en comederos y/o bebederos oxidados.

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml.

Nº de Registro: AV nº 528/01/12NFSVPT